

VAI AO HOSPITAL?



Fique atento ao **Tromboembolismo Venoso (TEV)** – uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo¹

10 milhões

de casos de TEV ocorrem todos os anos no mundo¹

± **60%**

de todos os casos de TEV ocorrem no hospital ou durante o período de 90 dias pós internação²

1 EM 4

pessoas morre de causas relacionadas aos coágulos sanguíneos³

ABRA
SEUS OLHOS
PARA A TROMBOSE



DIA MUNDIAL DA TROMBOSE
13 de OUTUBRO

Isth
International Society on
Thrombosis and Haemostasis

SOBRE A Aspen Pharma

- Aproximadamente **10.000 colaboradores em 55 países**⁴
- Empresa farmacêutica multinacional líder de marca e especialidade com história de **21 anos**⁴
- Visa melhorar o **acesso a medicamentos de alta qualidade** para pacientes em todo o mundo⁴
- **23 instalações de fabricação ao redor do mundo e em 15 locais**, com aprovações internacionais de agências reguladoras globais⁴
- **Mais de 150 países** têm acesso aos produtos da Aspen⁴

A ASPEN TEM ORGULHO DE PARTICIPAR DESTA MOVIMENTO GLOBAL QUE AJUDA A SALVAR VIDAS!
Apoie o Dia Mundial da Trombose em 13 de Outubro e faça a diferença.

#WTDDay20

#EyesOpenToThrombosis


ABRA SEUS OLHOS PARA A TROMBOSE

TEV=TVP+EP

Se um coágulo de sangue se forma em sua perna, ele é chamado Trombose Venosa Profunda (TVP). Se o coágulo em sua perna se rompe e viaja até seus pulmões, ele é chamado Embolia Pulmonar (EP). Juntos, são conhecidos como Tromboembolismo Venoso (TEV).¹

10 MILHÕES DE CASOS DE TEV OCORREM TODOS OS ANOS NO MUNDO¹

Nos Estados Unidos e Europa, TEV e seus eventos relacionados matam mais pessoas que AIDS, câncer de mama, câncer de próstata e acidentes de trânsito juntos.¹



QUANDO VOCÊ CORRE RISCO DE DESENVOLVER TEV?¹

RISCO GRAVE	RISCO MODERADO
Ser hospitalizado por longo período	Idade (60+)
Ser submetido à cirurgia (especialmente no quadril, joelho ou cirurgias oncológicas)	Histórico pessoal ou familiar de coágulos sanguíneos
Estar imobilizado por muito tempo (ex.: paciente acamado)	Câncer / Quimioterapia
	Uso de medicamentos à base de estrogênio (contraceptivos e orais e terapia de reposição hormonal)

OUTROS FATORES

- Obesidade
- Gravidez ou puerpério
- Fumo
- Consumo de álcool

O TEV PODE SER PREVENIDO

O que você pode fazer para diminuir seus riscos:^{1,2}



Solicite uma avaliação de risco de TEV para entender seus fatores de risco.

Trata-se de um questionário com os seguintes dados:

- idade
- histórico médico
- medicação em uso
- estilo de vida



Informe-se sobre as opções na prevenção do TEV

Alguns medicamentos podem ser utilizados como anticoagulantes ou outros para evitar que coágulos se formem.

Dispositivos mecânicos também podem ser usados, como meias de compressão ou dispositivo de compressão pneumática intermitente.



Siga todas as orientações médicas, tome os medicamentos prescritos e tire todas as suas dúvidas.



Faça exercícios para melhorar a circulação. Você pode ser solicitado a se mover ou fazer exercícios com a perna ou pé o quanto antes.

1 EM 4

pessoas morre de causas relacionadas aos coágulos sanguíneos – então não se cale!³

60% de todos os casos de TEV ocorrem no hospital ou durante o período de 90 dias pós internação²